

OČKOVACÍ KALENDÁŘ – pravidelné očkování dětí v České republice

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, s účinností od 1. 1. 2007.

Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinné.

Věk dítěte	Pravidelné očkování	Očkovací látka
4. den až 6. týden	tuberkulóza	BCG vaccine SSI
od 13. týdne 1. dávka	záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
za měsíc po 1. dávce 2. dávka	záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
za měsíc po 2. dávce 3. dávka	záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
3. – 4. měsíc po primovakcinaci	tuberkulóza - přešetření místa vpichu a regionálních uzlin	
za 6 měsíců po 3. dávce 4. dávka (nejpozději do 18 měsíců věku)	záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
od 15. měsíce 1. dávka	spalničky, příušnice a zarděnky	Trivivac
21. -25. měsíc, event. později přeočkování	spalničky, příušnice a zarděnky	Trivivac
od dovršení 5. do dovršení 6. roku přeočkování	záškrt, tetanus a dávivý kašel	Infanrix
od dovršení 10. do dovršení 11. roku 5. dávka - přeočkování	přenosná dětská obrna	Imovax Polio
od dovršení 11. do dovršení 12. roku	Tuberkulóza - tuberkulinový test (Mantoux), přeočkování pouze při negativním tuberkulinovém testu	BCG vaccine SSI
od dovršení 12. do dovršení 13. roku	virová hepatitida B - pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců).	Engerix B paed.
od dovršení 14. do dovršení 15. roku	tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech	Alteana

Doplňující informace:

1. **U dětí narozených před 1. 1. 2007** se základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilem influenzae b a virové žloutence typu B se provede a dokončí podle původního právního předpisu.

2. **Hexavakcína**, obsahující očkování proti šesti onemocněním - záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární složku), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně (inaktivovanou složku) a virové hepatitidě typu B, je určena k očkování dětí narozených po 31. 12. 2006.

Všem dětem narozeným před 1. 1. 2007, jimž rodiče zakoupili tři dávky hexavakcíny, bude 4. dávka hexavakcíny aplikována zdarma. Toto očkování je nutno provést nejpozději do 18 měsíců věku dítěte.

3. Přeočkování proti přenosné dětské obrně

Inaktivovanou očkovací látkou:

od dovršení 10. do dovršení 11. roku věku dítěte;

dále: v roce 2007 - děti narozené od 1. 5. 1993 do 30. 4. 1994;
v roce 2008 - děti narozené od 1. 5. 1994 do 30. 4. 1995;
v roce 2009 - děti narozené od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1996.

Živou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně u dětí nar. před 1. 1. 2007 takto:

V roce 2007 - základní očkování 2 dávkami u dětí narozených v roce 2006;
- přeočkování 2 dávkami u dětí narozených v roce 2005.
V roce 2008 - přeočkování 2 dávkami u dětí narozených v roce 2006.

4. Očkování proti **pneumokokovým** nákazám: děti do 5 let věku s indikacemi stanovenými vyhláškou. Informace poskytnou dětské lékaři.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 47 odst. 3 ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.